

RINDE+ Fresa

Tips agronómicos para una planta equilibrada,
fruta firme y cosecha de calidad.

MANEJO POR ETAPA · CALIDAD · BIOQUIM

Del establecimiento a la poscosecha, decide con monitoreo y diagnóstico.



BIOQUIM AGRO

Cosechas que rinden mucho más...

La fresa se maneja en ciclos que se traslapan

En variedades de producción continua, la planta puede florecer, cuajar y cosechar al mismo tiempo.



La fenología se observa en la planta; el calendario solo orienta.

El flujo cambia por variedad, clima, zona y sistema (suelo, sustrato, túnel o campo abierto).

01 · Establecimiento: primero, una raíz activa

Trasplante | El arranque parejo comienza con planta sana, cama bien preparada y agua disponible.

TIP DE CAMPO

Cama y drenaje

Evita encharcamientos; revisa nivelación, salida del agua y contacto raíz-suelo.

TIP DE CAMPO

Uniformidad

Verifica corona a la altura correcta, plantas firmes y humedad homogénea.

TIP DE CAMPO

Riego por goteo

Comprueba caudal, presión y humedad junto a la zona radicular.

OPCIONES BIOQUIM POR OBJETIVO

Raizgro Plus · Bio-Jash 12-32-06 · Biosoil CH · Bazyme

Selecciona según análisis, sistema y necesidad. Los bioestimulantes complementan; no sustituyen drenaje, riego ni fertilización base.

Referencia técnica: la planta recién establecida es sensible a sequía y salinidad; mantener humedad sin agua estancada.

02 · Desarrollo y floración: equilibrio antes que exceso

Una planta demasiado vegetativa puede complicar ventilación, sanidad y cosecha.

RUTINA 01

OBSERVA

hojas nuevas, corona, vigor y uniformidad

RUTINA 02

MIDE

agua, pH/CE y nutrición según suelo o sustrato

RUTINA 03

AJUSTA

N y otros nutrientes con análisis; evita excesos

RINDE+ · OPCIONES PARA CUaje Y ACTIVACIÓN

Folamin Cuaje · Citogrowth · Forteamin

Acompaña un plan nutricional diagnosticado. Protege polinizadores y evita aplicaciones que interfieran con su actividad.

Fresa florece en varias oleadas: revisa cada bloque y no apliques por fecha fija.

03 · Cuaje y sanidad: reduce humedad sobre flores y fruta

El microclima del dosel y el agua libre pueden elevar el riesgo de pudriciones.

TIP 01

Riego al suelo

Prefiere goteo cuando el sistema lo permita; evita mojar flores y frutos.

TIP 02

Cosecha sanitaria

Retira fruta dañada y residuos; registra focos y condiciones húmedas.

La nutrición no controla Botrytis: integra higiene, ventilación, riego y protección registrada.



BIOQUIM · POR DIAGNÓSTICO

BA-Quel CaB · BA-Quel B · Forteamin

04 · Llenado: consistencia para firmeza y calidad

La meta es sostener crecimiento de fruta sin someter la raíz a extremos de humedad o sales.

1

AGUA ESTABLE

Evita alternar sequía y saturación; confirma humedad en cama o sustrato.

2

NUTRICIÓN MEDIDA

Revisa K, Ca y balance total con análisis y respuesta del cultivo.

3

FRUTA PROTEGIDA

Reduce golpes, exposición a calor y contacto con fruta dañada.

OPCIONES RINDE+ PARA EVALUAR

Folamin K · Folamin Quality · K-Frut · Solufeed Turgent · Forteamin

Son herramientas dentro de un programa equilibrado; el producto por sí solo no garantiza firmeza ni vida de anaquel.

05 · Cosecha: el cuidado continúa después del corte

El estándar de color depende del destino; cosecha frecuente y manejo suave ayudan a preservar calidad.

POSCOSECHA 01

SELECCIONA

Color y firmeza conforme a comprador y distancia de mercado.

POSCOSECHA 02

PROTEGE

Cosecha con fruta seca cuando sea posible; evita compresión y golpes.

POSCOSECHA 03

ENFRÍA

Lleva pronto a sombra/frío y mantén higiene de recipientes y manos.

MIDE CADA SEMANA

kg/ha

vendible

%

primera calidad

°Brix

sólidos solubles

N

firmeza

En lotes demostrativos compara bloques equivalentes; registra también descartes, precio y costo.

RINDE+ Fresa: un diagnóstico, una decisión, un indicador

Usa el semáforo en cada recorrido. Si hay duda, toma muestra y confirma antes de aplicar.

AVANZA	planta uniforme · fruta limpia · riego estable
AJUSTA	síntoma en zona definida · revisa causa y corrige una variable
DIAGNOSTICA	marchitez, pudrición o caída de calidad sin causa confirmada

Comparación: bloque testigo vs. manejo RINDE+ · mismas fechas, variedad y criterios de cosecha.

Fuentes técnicas: INIFAP, Agenda Técnica Michoacán (riego y niveles foliares); UC IPM, Watering Strawberries, Botrytis Fruit Rot y Cultural Tips for Growing Strawberry; INIFAP, "Calidad de fresa afectada por la relación nitrato:amonio".

Bioquim Agro · RINDE+ Fresa | Validar dosis, mezclas, registros y uso con etiqueta vigente y asesoría local.