

RINDE+ Maíz

Decisiones agronómicas que ayudan a llevar el potencial del cultivo hasta la cosecha.

TIPS AGRONÓMICOS · NUTRICIÓN · BIOESTIMULACIÓN

Del establecimiento al llenado, guiado por la fenología y el diagnóstico.




BIOQUIM AGRO

Cosechas que rinden mucho más...

El resultado se construye durante todo el ciclo

RINDE+ acompaña seis momentos; la nutrición base y el manejo del lote siguen siendo la estructura.



Una alternativa principal por etapa; complementa solo cuando el lote lo justifique.

RINDE+ Maíz 2026 · semilla, VE-V3, V4-V8, V9-VT, VT-R1 y R2-R6.

Arranque parejo: semilla, establecimiento y raíces

Semilla–V4 | Observa uniformidad antes de pensar en corregir con foliar.

TIP 1 · SIEMBRA

Uniformidad

Semilla viable, profundidad consistente, humedad y cierre de surco adecuados al suelo.

TIP 2 · VE–V3

Cuenta plantas

Revisa emergencia, claros, daño de plántula y distribución por metro de surco.

TIP 3 · V2–V4

Abre raíces

Evalúa raíces, compactación, humedad y señales de estrés en varios puntos.

OPCIONES RINDE+

Seed Max · Bio-Jash / Start-Gro / Solufeed Start · Raizgro Plus / 800 · Biosoil CH

Referencia interna Seed Max: 1–2 L/t de semilla; confirmar etiqueta, calidad de semilla y compatibilidad.

V4–V8: cuida el periodo de crecimiento temprano

En esta ventana se define buena parte de la arquitectura inicial y la capacidad de competir.

REVISA EN CAMPO

- 1 **Malezas** competencia temprana y escapes
- 2 **Nutrición** suelo, humedad y patrón de síntomas
- 3 **Canopia** uniformidad, hojas nuevas y vigor
- 4 **Equipo** cobertura y momento si hay aplicación

ALTERNATIVAS BIOQUIM

C-Real Max · Fortifol Max
Folamin N · Solufeed Growth

Elige según programa base y objetivo del lote; los foliares complementan, no sustituyen fertilización edáfica.

Dosis de referencia interna: C-Real Max 1–2 L/ha en 2–3 aplicaciones; Fortifol Max 1–2 L/ha cada 10–15 días. Validar etiqueta vigente.

Control de malezas y dosis herbicida: usa etapa del maíz, especie de maleza y etiqueta del herbicida.

V9–VT: prepara el cultivo para la etapa reproductiva

Antes de panoja, una visita bien hecha puede detectar brechas de agua, nutrición o sanidad.

DIAGNÓSTICO 01

MIRA EL LOTE

uniformidad de altura, color y expansión foliar

DIAGNÓSTICO 02

COMPARA

síntomas por zona, suelo y manejo

DIAGNÓSTICO 03

PRIORIZA

causa probable antes de elegir producto

RINDE+ · OPCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO

Folamin Complex · BA-Quel Zn · Forteamin

Usa micronutrientes con diagnóstico; Forteamin acompaña el manejo bajo estrés, sin sustituir agua o nutrición base.

VT-R1: protege floración y cuajado de granos

La floración es una ventana crítica: revisa panoja, emisión de estigmas y humedad del suelo.

TIP 01

AGUA

evita estrés alrededor de floración

TIP 02

SINCRONÍA

observa salida de polen y estigmas

TIP 03

SANIDAD

vigila hojas, cogollo y tallos



RINDE+ · BMo Bioquim · Folamin Cuaje · Forteamin · Bazyme

Son complementos por diagnóstico; no reemplazan polinización, agua ni protección fitosanitaria.

R2–R6: acompaña el llenado con criterio

En grano en desarrollo, combina seguimiento del cultivo con una propuesta acotada y comprobable.

OBSERVA

Mazorca

Cuajado, punta, llenado y uniformidad de grano en plantas representativas.

PROTEGE

Área foliar y tallo

Revisa estrés, enfermedades, plagas y acame; registra focos.

COMPLEMENTA

RINDE+

Finish 13-6-40 o Folamin K / K-Brix; elegir una alternativa según objetivo.

MEZCLA DE REFERENCIA AL INICIO DEL LLENADO · R2–R3

Solufeed Finish 13-6-40 1 kg/ha + BMo 1 L/ha + Forteamin 250 mL/ha + Bazyme 250 mL/ha

Referencia RINDE+; confirmar etiqueta, compatibilidad, calidad de agua y recomendación local antes de usar.

Semáforo RINDE+: medir antes de escalar

Cierra cada recorrido con una decisión útil y un indicador comparable.

AVANZA	stand uniforme · crecimiento activo · sin nueva limitante
CORRIGE	focos definidos · confirma causa y ajusta una variable
DETÉN Y DIAGNOSTICA	pérdida de plantas · estrés severo · síntoma sin confirmar
Registra: plantas por metro · malezas · humedad · síntomas · mazorcas por planta · costo · cosecha.	

Fuentes: Programa RINDE+ Maíz, Bioquim Agro (2026) · INIFAP, Relaciones hídricas en maíces de Valles Altos · CIMMYT, Water stress before and during flowering in maize · UMN Extension, Corn Growth and Development.